

په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې

دمور په شیدو تغذیه او کوید-۱۹

د روغتیايي کارکونکو لپاره


اپریل ۱۸، ۲۰۲۰



سریزه

په مکرر ډول دغه پوښتل شوي پوښتنې د کوید-۱۹ ویروس، د مور د شیدو او نورو اړوند برخو کې د روغتیا نړیوالې ادارې (WHO) لنډمهاله لارښود بشپړوي: د کوید-۱۹ ناروغی د احتمالي پېښو په صورت کې د په کلنیکي لحاظ د شدیدو تنفسي انتاناتو مدیریت کوي او هغو پوښتنو ته ځوابونه چې د روغتیا نړیوال سازمان د لاندې سپارښتنو په اړه را پیدا شوي دي.

[www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected](http://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected)



د روغتیا نړیوالې ادارې (WHO) لارښود او مکرر ډول پوښتل شويو پوښتنو انعکاس:

- I. د مور د شیدو له لارې د کوید-۱۹ ناروغی د انتقال احتمالي ویرو په اړه د لاس رسي وړ شواهد؛
- II. له زیږون وروسته ماشوم ته د مور شیدو ورکولو او د زیږون سره سم د مور لخوا ماشوم په خپله غیږه کې نیولو (د مور او ماشوم د بدن مستقیم اړیکه) محافظوي اغیزې؛
- III. د پوډري شیدو د نامناسب استعمال زیان رسوونکې اغیزې

همدارنگه په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې د شیدې خورونکو او ماشومانو د تغذیې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د سپارښتنو او په بیرنيو حالاتو کې د شیدې خورونکو او ماشومانو د تغذیې په اړه د مختلفو دارو د کاري ډلې عملياتي لارښود په پام کې نیسي. د یوې ګډې پریکړې له مخې دا په ډاګه کیږي چې څه ډول روغتیايي کارکونکي کولای شي د ورځنۍ کاري دندې په توګه د میندو او کورنیو سره د خدمتونو په برخه کې د زیږون او میندو پورې اړوند خدمتونو او ټولنه کې دغه سپارښتنې عملي کړي.

www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

1. ایا کوید-۱۹ ویروس ماشوم ته د مور د شیدو (تی ورکولو) له لارې لیږدول کیږي؟

تردې دمه هیڅ کومه داسې پېښه نده موندل شوې چې ماشوم ته د تي (شیدو) ورکولو له لارې د کوید-۱۹ فعال ویروس (چې د ناروغی لامل کیږي) انتقال شوی وي او نه هم تر اوسه پدې اړه کومه مشکوکه پېښه ثبت شوې ده. له همدې امله داسې بریښي چې دغه ویروس د شیدو (تي) ورکولو له لارې نه لیږدول کیږي او همدارنگه تر اوسه داسې کومه پېښه (تایید شوې یا مشکوکه) نه ده ثبت شوې چې د مور د شیدو له لارې کوم ماشوم ته کوید-۱۹ لیږدول شوی وي. پدې اړه څیړنې او آزمویښي دوام لري.

2. ایا په هغو ټولنو کې چې دغه ویروس خپور شوی، میندې باید خپلو ماشومان ته شیدې (تي) ورکړي؟

نوزیږو په سربېرې په هر ډول ټولنیز-اقتصادي چاپېریال کې د مور شیدې د شیدې خورونکو ماشومانو د بقا، روغتیا او ودې لپاره ګټه لري. ماشوم ته تی ورکول خپل د مور روغتیا ته هم ګټه لري او د مور روغتیا بڼه کوي. بلخوا تر اوسه هیڅ کومه داسې پېښه نه ده موندل شوې چې ماشوم ته د مور د شیدو له لارې د کوید-۱۹ ویروس لیږدول شوی وي. هیڅ داسې دلیل شتون لري چې د کوید-۱۹ ویروس د لیږدولو له ویرې د ماشوم د مور شیدې ورنکړل شي.

3. له زیږون وروسته باید سمدستي مور (چې په کوید-۱۹ اخته وي یا مشکوکه وي) خپل په غیږه کې ونیسي (د مور او ماشوم د بدن مستقیم اړیکه) او شیدې د ورکړي؟

هو، له ځنډ پرته باید مور خپل ماشوم په سینه (غیر) کې ونیسي او شیدې ورکړي

او همدارنگه له زیږون سره سم ماشوم ته د مور شیدې ورکول د مور د شیدو د پیل او تولید لامل کیږي کوم چې د نوزیږو ماشومانو د مړینې کچه راکموي. له زیږون سره ماشوم په سینه کې نیول او تی ورکول د کوید-۱۹ ناروغی د انتقال د ویرو په پرتله خورا زیاتې د پام وړ ګټې لري.

4. که چېرې کومه مور په کوید-۱۹ ناروغی اخته وي او یا مشکوکه وي، باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟

هو، ځکه چې تردې دمه د مور د شیدو له لارې ماشوم ته د کوید-۱۹ ناروغی د انتقال کومه پېښه نه ده ثبت شوې. میندې باید خپلو ماشومانو ته د تي ورکولو پرمهال د حفظ الصحي اړوند ټکو ته پام وکړي؛ د امکان په صورت کې د له ماسک څخه استفاده وکړي تر څو ماشومانو ته د کوید-۱۹ ناروغی د انتقال د امکان کچه راکمه کړي. میندو او کورنیو ته سپارښتنه کیږي چې په کوید-۱۹ ناروغی اخته ماشومانو ډیر کم شمیر پېښو له جملې ډیرې یې د یوې عادي او بی نښې ناروغی په توګه څرګنده شوي دي. بلخوا ماشوم ته د مور د شیدو په اړه خورا کره، تجربه شوي او دقیق شواهد شتون لري چې ماشوم د مور شیدې نوزیږو په شمول د ماشومانو د مړینې کچه راکموي او په هر ډول ورکول د اقتصادي محیط او چاپېریال کې د ماشوم د بقا او روغتیايي ودې لپاره اړین دي.

8. که چیرته په کویډ-۱۹ اخته/مشکوکه مور نشي کولای چې خپل ماشوم ته شیدي ورکړي، پدې صورت کې باید څه ډول نوزیرو ماشوم/شیدي خورونکي ماشوم ته د مور شیدي ورکړل شي؟

غوره د حل لاره دا ده چې:

- د پمپ یا لاس په ذریعه د مور د شیدو ایستل:
 - د امکان په صورت کې د ځانګړي پمپ په مرسته د مور شیدي وایستل شي او ماشوم ته د ورکړل شي. که چیرې د شیدي ایستلو ځانګړی پمپ شتون ونلري، نو د لاس په ذریعه باید و ایستل شي. دواړه حالتونه په مساوي ډول اغیزمن ثابتیدلای شي.
 - د پمپ یا لاس په ذریعه د شیدو ایستل د مور تر رضایت او خوښي، اړینو وسایلو (د بیلګې په ډول پمپ) شتون، د حفظ الصحي اړوند شرایطو او لګښت پورې اړه لري.
 - د مور شیدي ایستل دا ګټه هم لري چې مور شیدي جاري پاتې شي او مور وکولای شي له جوړېدو وروسته ماشوم ته خپلي شیدي ورکړي.
 - مور او بل هر څوک چې د مور شیدي اوباسي باید خپل لاسونه مخکې لدې چې شیدي وپمپ یا د شیدو پمپ او بوتل لمس کړي، باید خپل لاسونه پاک پرمینځي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له هر څل شیدو ایستلو وروسته پمپ او بوتل پاک او خوندي دي. پمپ او نور اړینو توکي باید پاک او خوندي وساتل شي. (د نورو معلوماتو لپاره لسمه پوښتنه وګورئ)
 - ایستل شوي شیدي باید په پاک ګیلاس او کاجوغه سره ماشوم ته ورکړل شي. دا کار باید داسې څوک وکړي چې د یاد ویروس نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي او ماشوم د ارامتیا احساس ورسره کوي.
- د نورو میندو شیدي
 - د بلې مور شیدي – که چیرې د مور د شیدو ایستلو امکان نه وي او د مور شیدو بانک (چیرته چې د نورو میندو شیدي موجودې وي یا پلورل کېږي)، نو پدې صورت کې د نورو میندو له شیدو څخه تر هغه وخت پورې استفاده وشي تر څو چې د مور روغتیايي حالت نارمل شي.
- که چیرې د مور شیدي ایستل ناشوني وي او د مور د شیدو بانک شتون ونلري:
 - دایه مور (11 پوښتنه وګورئ)
 - پوډري شیدي د ورکړل شي. پدې صورت کې باید ددې خبرې ډاډ ترلاسه شي چې پوډري شیدي په ښه ډول چمتو، خوندي او په اړوند شرایطو برابرې دي.

9. که چیرې کومه مور په کویډ-۱۹ ناروغی اخته/مشکوکه وي او مونږ یې شیدي ماشوم ته ورکړو، نو ایا د مور څخه ایستل شوي شیدي د ماشوم لپاره خوندي دي؟

هو، ځکه چې تردې دمه د هیڅ مور په شیدو کې د کویډ-۱۹ فعال ویروس کومه پېښه نه ده ثبت شوې. تراوسه هیڅ داسې کومه پېښه نه ده موندل شوې چې د یوې مور څخه د ماشوم ته د شیدي له لارې د کویډ-۱۹ ویروس لیږدول شوی وي.

5. هغه میندې باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې په کویډ-۱۹ ویروس اخته وي یا مشکوکه وي؟

که چیرې یوه مور په کویډ-۱۹ ویروس اخته وي یا مشکوکه وي:

- په مکرر ډول خپل لاسونه په صابون او اوبو سره ومینځي، له الکولي ضد عفوني مایع څخه استفاده وکړي؛ په ځانګړي ډول مخکې لدې چې خپل ماشوم لمس کړي.
- د شیدي ورکولو پرمهال له ماسک څخه استفاده وکړي او اړینه ده چې د ماسک د مرطوب کېدو په صورت کې له ځنډ پرته له نوي ماسک څخه استفاده وکړي؛ ماسک تبدیل کړي. له یو ماسک څخه دوه ځلي استفاده ونکړي، ماسک لمس نکړي او په داسې طریقه سره ماسک خلاص او پر ځای یې بل واچوي چې تر ډیره د ماسک ځانګړي برخه لمس نشي.
- د توخي یا پرنجې پرمهال خولي ته دستمال ونیسي او سمډستي یې په خوندي ځای کې وغورځوي او له ځنډ پرته له الکولي ضد عفوني مایع څخه استفاده وکړي او خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځي.

په منظمه توګه سطحونه پاک او تعقیم کړي

6. که چیرې په کویډ-۱۹ ناروغی اخته مور ماسک ونلري، بیا هم باید خپل ماشوم ته شیدي ورکړي؟

نوزیرو په سربیره هو، ځکه چې د مور شیدي له کوم شک او پوښتنې پرته د شیدي خورونکو ماشومانو د مړینې کچه راکموي او د ماشومانو د بقاء او ذهني پیاوړتیا لپاره بې شمېره ګټه لري. که چیرې ماسک شتون ونلري، بیا هم د مور شیدي حتمي دي. نور وقایوي تدابیر او پاملرنې لکه د لاسونو مینځل، خپلي سیني پرمینځل، د توخي یا پرنجې پرمهال له دستمال څخه استفاده او نور ... اړین دي. میندې کولای شي په خپل کور کې ماسکونه جوړ کړي او استفاده ترې وکړي. اوسنیو شرایطو ته په کتو، اوس ددې وخت نه دی چې د کورنیو ماسکونو په اړه سپارښتنې وړاندې کړو.

7. ایا په کویډ-۱۹ اخته/مشکوکه مور باید مخکې لدې چې خپل ماشوم ته شیدي ورکړي خپلي سیني ومینځي؟

که چیرې کومه مور په دغه ناروغی اخته وي یا مشکوکه وي، نو پدې صورت کې باید خپل ماشوم ته د شیدو ورکولو لږ تر لږه شل ثانیې مخکې خپلي سیني په ګرمو اوبو او صابون سره ومینځي. اړتیا نشته چې میندې هر ځل ماشوم ته له شیدو ورکولو وړاندې خپلي سیني پرمینځي.

13. که چیري د کومي مور د کويډ-۱۹ تيست پايلی مثبت وي (په کرونا اخته وي)، نو ايا پدي صورت کي نوزيرو ماشوم/شيدې خورونکي ماشوم ته د مور د شيدو ورکولو کي د بدلون سپارښتنې شتون لري؟

او سمدستي ملاحظات او الزامات شتون نه لري.

کله چې د يوې مور د کويډ-۱۹ ناروغی تاييد شي يا علايم وليدل شي، نو مور بايد د حفظ الصحي اړوند پاملرنې په پام کې ونيسي تر هغې چې له ناروغی څخه شفا پيدا کوي.

14. که چيرې مور په کويډ-۱۹ اخته وي يا شک پرې کيږي چې په دغه ويروس اخته ده، نو ايا پدي صورت کي بايد خپل نوي زيږيدلي ماشوم ته د خپلو شيدو سربريره پوډري شيدې (له خپلو شيدو سره ګډول، يا دغه شيدې ورکول) هم ورکړي؟

نه، اړتيا نشته چې په کويډ-۱۹ اخته ناروغی مور نوزيرو ماشوم ته پوډري شيدې ورکړي. ځکه چې د پوډري شيدې ورکول د مور د شيدو اندازه راکموي. شيدې ورکونکو ميرمنو ته بيا مشوره ورکړل او ملاتړ يې وشي چې څه ډول او په کومه طريقه ماشوم ته شيدې ورکړي تر ددې ډاډ ترلاسه شي چې ماشوم په کافي اندازه شيدې ترلاسه کوي. ميندو ته بايد د شيدو ورکولو په اړه مشوره ورکړل شي، د شيدو لږوالی درک کړي او پدې سره پوه شي چې ميندې څه ډول وکولای شي د خپل ماشوم لوره درک کړي، په ښه ډول يې تغذيه يې کړي، او خپل ماشوم ته د شيدې ورکولو په فريکونسي (د شيدو ورکولو وختونه) کې زياتوالی راولي.

15. د هغو ميندو لپاره چې ددې ويره لري چې ګواکي د شيدو له لارې به د دوی ماشوم ته کويډ-۱۹ وپرس وليږدول شي کليدي پيغامونه کوم دي؟

پدې اړه د مور او کورنی اندېښنو ته د رسېدنې او دوی ته د قناعت ورکولو لپاره بايد لاندې پيغامونه وړاندې شي:

- تر اوسه هيڅ کومه داسې پېښه نه ده ثبت شوې چې د مور د شيدو له لارې د ماشوم ته کويډ-۱۹ ليردول شوی وي او نه هم پدې برخه کې کوم شواهد شتون لري. د دنوزيرو په سربريره په ياد ويروس د ماشومانو د اخته کېدو کچه ټيټه ده.
- په کويډ-۱۹ ناروغی اخته ماشومانو ډير کم شمير پېښو له جملې ډيری يې د يوې عادي او اسيمپتوميک ناروغی په توګه څرګنده شوي دي.
- د مور شيدې (د دنوزيرو په سربريره د ټولو ماشومانو لپاره) او د زيرون سره سم د ماشوم لپاره د مور غير د ماشومانو د مړينې کچې راکمولو او د ماشومانو د بقاء او روغتيايي ودې په برخو کې د پام وړ ګټې لري. ماشومانو د مور شيدې خپله د مور د روغتيا لپاره اړينې دي، ځکه چې ماشوم ته د مور شيدې ورکول په ميندو کې د سينو او رحم سرطان ناروغيو ويره راکموي.
- مور شيدې د کويډ-۱۹ ناروغی د ليردول د احتمالي ويرو په پرتله خورا زياتې د پام وړ ګټې لري. د مور شيدې د نو زيرو په شمول د ماشومانو د بقاء، روغتيا او ودې لپاره ګټه لري. ماشوم ته تې ورکول خپل د مور روغتيا ته هم ګټه لري او د مور روغتيا ښه کوي.

10. که چيرې په کويډ-۱۹ ناروغی اخته/مشکوکه ميرمن ماشوم ته خپلې شيدې وباسي، نو پدې صورت کې مور بايد د شيدې ايستلو پمپ اړوند فعاليتونو، د شيدو ذخيره کولو توکو، د شيدې ورکولو لوازمو په اړه نورو کومو اضافي اقداماتو ته پاملرنه وکړي؟

ددغه ويروس پرته بايد ميندې ياد توکي او وسايل له هر ځل استعمال وروسته پاک ومنيځي. له هر ځل استعمال وروسته پمپ او نورو اړوند وسايل په مایع صابون سره ۱۰-۱۵ ثانيې ومنيځي (د بيلګې په ډول مایع صابون او گرمې اوبه). د پورې په گرمو اوبو سره منيځل. د شيدو پمپ ځيني برخي د په مایع ضد عفوني محلول کې اچول (که چيرې موجود وي). د پمپ له استعمال مخکې د هغه د کارونې او استعمال لارښوونې وګورئ.

11. که چيرې په کويډ-۱۹ اخته مور خپل ماشوم ته شيدې نشي ورکولای يا د مور شيدې ايستل ناشوني وي، نو پدې صورت کې د دايه مور سپارښتنه کيږي؟

د ميندو/کورنيو رضابيت، ملي لارښوونو، کلتوري اجازې، د دايه ګانو شتون، او د ميندو د ملاتړ لپاره د دايه ګانو شتون او خدمتونو ته په کتو دايه مور د حل يوه لاره کېدای شي. که چيرې ايډز (HIV) خپور شوی وي، نو د ملي لارښوونو له مخې بايد د دايه مور معاینات وشي (د امکان په صورت کې) او د ايډز اړوند مشورې بايد ورته وړاندې شي. که چيرې معاینات امکان نه لري، د ايډز د خطر ارزونه د ترسره شي، که چيرې دا هم امکان نلري، د دايه مور بايد اړين او لازمي ملاتړ وشي، اړوند همکاري او مرسته بايد ورسره وشي. د ماشوم ته د شيدې ورکولو پرمهال ماشوم ته د HIV د ليردول د مخنيوي په اړه بايد مشورې ورکړل شي.

• ځوانو دايه ګانو ته لومړيتوب ورکړئ.

12. که چيرې په کويډ-۱۹ ناروغی اخته ميرمن د نازک روغتيايي حالت يا کوم بلې ناروغی له ماشوم ته شيدې نشي ورکولای، نو څه وخت بايد بيرته خپل ماشوم ته شيدې ورکول پيل کړي؟

کله چې له ناروغی ښه شي او دا احساس وکړي چې ماشوم ته شيدې ورکولای شي؟ پدې برخه کې کوم مشخص ځنډ، وخت او وقفه شتون نلري. هيڅ داسې کوم شواهد شتون نه لري چې د کويډ-۱۹ له امله ماشوم ته د شيدو ورکولو په دفعات او کلنيکي لارښوونو کې بدلون راوستل شي. د مور د بشپړې روغتيا د تضمین، شيدې ورکولو او نورو لازمي برخو کې بايد د مور ملاتړ وشي.

19. ایا روغتیایي مرکزونه باید دا ومني چی د هغو شیدي خورونکو ماشومانو لپاره وریا پودري شیدي ورکړي چی میندی بی په کوايد-۱۹ اخته دي یا شک پري کيږي چی بنایي په ویرس اخته وي؟

نه، په وریا ډول باید پودري شیدي ورنکړل شي. د اړتیا په صورت کې باید اړتیا ارزونی وروسته په واخیستل (وپیرودل) شي. هغه شیدي چی د مرستي په ډول په وریا ورکول کيږي د کیفیت له مخي مختلف ډولونه لري، د اړتیا سره سم تناسب په نظر کې نه نیول کيږي، په غلط ژبه مهر پري وهل شوی، په صلیقوي ډول توزیع کيږي، هغو خلکو ته نه ورکول چې اړتیا ورته لري، په دوامداره ډول نه ورکول کيږي او ستونزو د راکمولو لپاره زیات وخت او سرچینو ته اړتیا ده.

20. ولی د ماشومانو او میندو په اړه د روغتیا نړیوالی اداري سپارښتنی (د بیلگی په ډول په کويډ-۱۹ اخته میندو او ماشومانو ترمنځ اړیکه، ماشوم ته د مور شیدي ورکول او نور ...) په ملي، او مسلکي کچه ادارو ترمنځ توپیر کوي؟

ځکه چی د روغتیا نړیوالی اداري سپارښتنی نه یوازې په کويډ-۱۹ د ماشومانو د اخته کېدو د ویري په اړه دي، بلکي نورو جدي ناروغیو او مړیني ویري په پام کې نیسي چی ماشومانو د مور د شیدي د نه ورکولو، د پودري شیدو څخه د ناسمی گټه اخیستنې، له زیرون سره سم د مور د شیدو د نه استفادي او د زیرون پرمهال ماشوم د مور له سینی (غیري) څخه د لیروالی له امله رامنځته کيږي.

د نورو ادارو سپارښتنی بنایي یوازې د کويډ-۱۹ د لیږدول په مخنیوي باید تمرکز وکړي، پرته لدې چی ماشوم ته د مور د شیدو او زیرون پرمهال د مور د غیري او تماس اهمیت ته پام ونکړي.

16. که چیري مور په کويډ-۱۹ ناروغی اخته وي یا شک وي چی په یادي ناروغی اخته ده، ایا د پودري شیدو ورکول نو زیرو ماشوم د روغتیا لپاره خوندي دي؟

نه، ځکه په هر ډول اقتصادي محیط او شرایطو کې د نو زیرو په سربرید ټولو ماشومانو لپاره د پودري شیدو د ناخونديتوب ویري تل شتون لري.

د پودري شیدو حذف اړوند ویري هغه وخت زیاتیري کله چی ماشوم ناروغ وي، خو خلک د اړتیا سره سم روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي، د ځنځاک پاکو اوبو ته کافي لاس رسی نه لري، پودري شیدو ته لاس رسی ستونزمن وي او یا هم د شیدو د خونديتوب تضمین نه کيږي، بیه یي لوړه وي او یا هم په دوامداره ډول د لاس رسی وړ نه وي.

مور شیدي د کويډ-۱۹ ناروغی د انتقال د احتمالي ویرو او ناروغی په پرتله خورا زیاتي د پام وړ گټي لري.

17. د مور او ماشوم تغذیه کولو په اړه د WHO سپارښتنی د کومی مودي لپاره اړونده دي؟

د تایید شوي / شک لرونکي COVID-19 سره د میندو د ماشوم زیرون او تغذیه کولو وړاندیزونه د هغه وخت لپاره دي کله چی هغه د اخته کېدو احتمال ولري، په داسي حال کې چی د ناروغی نیني یا د نینو له پیل څخه 14 ورځو وروسته چی هرڅومره اوږد وي.

18. په کويډ-۱۹ ناروغی اخته میندو او د دوی د ماشومانو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) سپارښتنی ولی د هغو سپارښتنو سره توپیر لري چی یاده اداره یي د ټولني د عامو وگرو لپاره په ټولنیز ډول د فاصلي مراعاتولو په برخه کې سپارښتنه کوي؟

د لویانو او تکلیو ماشومانو په اړه سپارښتنی ځکه باید مراعات شي چی دوی په خپل منځ کې په ټولنیز ډول واټن وساتي چی د هغو کسانو سره یي د اړیکو کچه راکمه شي چی په کويډ-۱۹ ناروغی اخته دي او همدارنگه د ویروس د لیږدول کچه به هم راکمه شي. ددې ستراتیژی له مخي به په عمومي ډول ددې ویرس د خپرېدو کچه راټیټه شي او د هغو لویانو شمیر به راکم کړي چی ډیري نور جدي ناروغی یي تیري کړي.

د دنوزیرو په سربرید د نورو شیدي خورونکو ماشومانو (هغه ماشومانو چی میندی یي په کويډ-۱۹ اخته وي یا شک پري کيږي چی په ویرس اخته دي) د روغتیا ساتنی او تغذیه په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د سپارښتنو موخه دا ده چی د ماشومانو بقاء او روغتیایي ودې په برخه کې له ځنډ پرته ښه والي رامنځته کړي. دغه سپارښتنی په شیدي خورونکو ماشومانو کې د کويډ-۱۹ ناروغی احتمالي خطرونه او د ماشومانو د نورو جدي ناروغیو او مړیني ویري په پام کې نیسي چی ماشومانو د مور د شیدي د نه ورکولو، د پودري شیدو څخه د ناسمی گټه اخیستنې، له زیرون سره سم د مور د شیدو د نه استفادي او د زیرون پرمهال ماشوم د مور له غیري (د مور او ماشوم د بدن مستقیم اړیکه) څخه د لیروالی له امله رامنځته کيږي.

په عمومي ډول په کويډ-۱۹ ناروغی د ماشومانو د اخته کېدو ویره کمه ده. په کويډ-۱۹ ناروغی اخته ماشومانو د ډیر کم شمیر پېښو له جملی ډیری یي د یوي عادي او بی نښی/نشانه ناروغی په توگه څرگنده شوي دي. مور شیدي د کويډ-۱۹ ناروغی د انتقال د احتمالي ویرو او ناروغی په پرتله خورا زیاتي د پام وړ گټي لري.



www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

یادونه

ددې پوښتنو ځوابونه د WHO د نشراتو او په بیړنیو حالاتو کې د شیدي خورونکو او نورو ماشومانو د تغذیه په اړه د ... د لارښوونې په اساس چمتو شوي دي. د روغتیا نړیوالی اداري موقتي لارښود ددغه اداري د نړیوالو ډاکترانو شبکي لخوا جوړ شوی دی چی دغه ډاکترانو SARS، MERS، شیدي انفونزا او کويډ-۱۹ ناروغانو درملنه کړي ده. که چیري په دې اړه معلومات ته اړتیا لري، په دغه ایمیل آدرس (outbreak@who.int) اړیکه ونیسي او د ایمیل نوم کويډ-۱۹ پوښتنه ولیکي.

“COVID-19 clinical question”
in the subject line.



د پریکړه کولو ونه

کوید-۱۹ پر مهال ماشوم ته د مور شیدې ورکول

د روغتیا ساتنې او هر اړخیز وضعیت لپاره لارښود

- د مور سره مرسته وکړئ ترڅو وکولای شي نوزیږو ماشومانو ته له زیږیدو وروسته په لومړني ساعت کې شیدې ورکول پیل کړي.
- او هر څومره ژر چې امکان لري جلدې تماس/اړیکه ورسره پیل کړئ.
- له شپږو میاشتو کم عمر لرونکي ماشومانو ته یوازې د مور شیدې ورکړئ.
- له شپږ میاشتو څخه زیات عمر لرونکي ماشومانو ته د مور د شیدو سره سم بشپړ او خوندي خواړه پیل کړئ.
- ماشوم له مور څخه مه جلا کړئ.
- مور ته سپارښتنه وکړئ چې:
 - د ماشوم د لمس کولو څخه د مخه خپل لاسونه په مکرر ډول په پاکو اوبو او صابون یا ضد عفوني مایع سره وپمښلي.
- هغه برخې/سطحي چې لمس کړي یې ډي، په منظم ډول پاک او ضد عفوني کړي.

کله چې مور روغه شي او کولای شي چې ماشوم ته شیدې ورکړي، مرسته ورسره وکړي تر څو وکولای شي بوځل یا خپل ماشوم ته شیدې پیل کړي

د نورو بنسټو لارو څخه د استفادې له مخې ادامه ورکړئ.

